

# Obične diferencijalne jednadžbe 2. reda

---

## Matematika 2

Erna Begović Kovač, 2019.

Literatura: I. Gusić, Lekcije iz Matematike 2  
<http://matematika.fkit.hr>

# Uvod

- Drugog reda  $\rightarrow$  druga derivacija

Već smo se susreli običnom diferencijalnom jednadžbom drugog reda.

- Vertikalni hitac  $y'' = -g$

## Primjer 1

Riješite diferencijalnu jednadžbu  $y'' = a$ , pri čemu je  $a \in \mathbb{R}$ .

Integriranjem dobijemo

$$y' = ax + C_1, \quad C_1 \in \mathbb{R},$$

te još jednim integriranjem

$$y = \frac{ax^2}{2} + C_1x + C_2, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

## Opće i partikularno rješenje

Opće rješenje ODJ 2. reda sadrži **dvije konstante**.

Da bismo dobili partikularno rješenje, tj. jedinstveno rješenje koje ne ovisi o konstantama, potrebno je imati **dva početna uvjeta**.

**Cauchyjev problem drugog reda** je sustav ODJ drugog reda i uvjeta oblika

$$y(x_0) = y_0,$$

$$y'(x_0) = v_0.$$

## Cauchyjev problem vertikalnog hitca

Cauchyjev problem

$$y'' = -g, \quad y(0) = y_0, \quad y'(0) = v_0.$$

opisuje položaj tijela u verikalnom hitcu u trenutku  $t$ .

$y_0 \leftarrow$  početni položaj

$v_0 \leftarrow$  početna brzina

$$\Rightarrow \quad y(t) = -\frac{gt^2}{2} + v_0 t + y_0$$

## Obična diferencijalna jednadžba 2. reda s konstantnim koeficijentima

Obična diferencijalna jednadžba 2. reda **s konstantnim koeficijentima** je jednadžba oblika

$$y'' + py' + qy = f(x),$$

gdje su  $p$  i  $q$  realni brojevi.

Ako je  $f(x) = 0$ , jednadžba je **homogena**, a inače je **nehomogena**.

## Homogena jednadžba

Za jednadžbu  $y'' + py' + qy = 0$  definiramo njenu **karakterističnu jednadžbu**

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0.$$

$$y'' \rightarrow \lambda^2, \quad y' \rightarrow \lambda, \quad y \rightarrow 1$$

Kvadratna jednadžba može imati

- (i) dva različita realna rješenja  $\lambda_1, \lambda_2$ ,
- (ii) jedno dvostruko realno rješenje  $\lambda_1 = \lambda_2$ ,
- (iii) dva kompleksno konjugirana rješenja  
 $\lambda_1 = \alpha + i\beta, \quad \lambda_2 = \alpha - i\beta.$

## Homogena jednadžba

- (i) Ako su  $\lambda_1 \neq \lambda_2$  rješenja karakteristične jednadžbe, onda je rješenje diferencijalne jednadžbe

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}.$$

- (ii) Ako je  $\lambda_1 = \lambda_2$  rješenje karakteristične jednadžbe, onda je rješenje diferencijalne jednadžbe

$$y = e^{\lambda_1 x} (C_1 + C_2 x).$$

- (iii) Ako su  $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ ,  $\lambda_2 = \alpha - i\beta$  rješenje karakteristične jednadžbe, onda je rješenje diferencijalne jednadžbe

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)).$$

## Primjer 2

Riješite jednadžbu  $y'' - 4y' + 4y = 0$ .

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad y = e^{2x}(C_1 + C_2x)$$

## Primjer 3

Riješite jednadžbu  $y'' - 4y' + 7y = 0$ .

$$\lambda^2 - 4\lambda + 7 = 0 \quad \Rightarrow \quad y = e^{2x}(C_1 \cos(x\sqrt{3}) + C_2 \sin(x\sqrt{3}))$$

# Cauchyjev problem titranja

Cauchyjev problem

$$y'' + \omega^2 y = 0, \quad y(0) = A, \quad y'(0) = 0,$$

opisuje problem titranja opruge po pravcu u trenutku  $t$ .

$A > 0 \leftarrow$  amplituda (opruga titra između  $-A$  i  $A$ )

$\frac{\omega}{2\pi} \leftarrow$  frekvencija

$\frac{2\pi}{\omega} \leftarrow$  period

$y(0) \leftarrow$  početni položaj

$y'(0) \leftarrow$  početna brzina

$$\lambda^2 + \omega^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad y = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$$

$$y(0) = A, \quad y'(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad y = A \cos(\omega t)$$

## Nehomogena jednadžba

Rješenje nehomogene jednadžbe  $y'' + py' + qy = f(x)$  dobije se kao

$$y = y_0 + y_P,$$

pri čemu je  $y_0$  rješenje homogene jednadžbe, a  $y_P$  je neko partikularno rješenje polazne jednadžbe.

Partikularno rješenje možemo naći **metodom neodređenih koeficijenata**. Prepostavimo da  $y_P$  ima isti oblik kao  $f(x)$ , ali s neodređenim koeficijentima.

## Nehomogena jednadžba

- (i) Ako je  $f(x) = e^{ax} P_n(x)$ , gdje je  $P_n(x)$  polinom stupnja  $n$  u varijabli  $x$  i  $a$  je nultočka karakterističnog polinoma kratnosti  $r$ , onda uzmememo

$$y_P = x^r e^{ax} Q_n(x),$$

pri čemu je  $Q_n$  polinom stupnja  $n$  s neodređenim koeficijentima.

- (ii) Ako je  $f(x) = e^{ax}(P_n(x) \cos(bx) + Q_m(x) \sin(bx))$ , gdje su  $P_n(x)$  i  $Q_m(x)$  polinomi stupnja  $n$ , odnosno  $m$ , u varijabli  $x$  i  $a \pm bi$  je nultočka karakterističnog polinoma kratnosti  $r$ , onda uzmememo

$$y_P = x^r e^{ax}(S_N(x) \cos(bx) + T_N(x) \sin(bx)),$$

pri čemu su  $S_N$  i  $T_N$  polinomi stupnja  $N = \max\{n, m\}$  s neodređenim koeficijentima.

## Primjer 4

Riješite jednadžbu  $y'' + 3y' = 3xe^{-3x}$ .

$$y_0 = C_1 + C_2 e^{-3x}$$

$$f(x) = 3xe^{-3x} \Rightarrow y_P = x(Ax + B)e^{-3x}$$

Uvrstimo  $y_P$  u polaznu jednadžbu i izjednačavanjem dobijemo  $A = -\frac{1}{2}$ ,  $B = -\frac{1}{3}$ , pa je

$$x\left(-\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}\right)e^{-3x} = -\frac{1}{2}x^2e^{-3x} - \frac{1}{3}xe^{-3x}.$$

Stoga je opće rješenje

$$y = y_0 + y_P = C_1 + C_2 e^{-3x} - \frac{1}{2}x^2e^{-3x} - \frac{1}{3}xe^{-3x}.$$