

# Primjena određenog integrala u geometriji

---

## Matematika 2

Erna Begović Kovač

<http://matematika.fkit.hr>

# Uvod


Korištenjem integralnog računa računat ćemo

- površine ravninskih likova i
- volumen tijela nastalog rotacijom.

# Površina


Računanje površine podskupa ravnine zadanog uvjetima

$$a \leq x \leq b, \quad g(x) \leq y \leq f(x)$$



## $f$ i $g$ pozitivne funkcije


Ako su  $f$  i  $g$  pozitivne funkcije, imamo



$$\mathcal{P}_1 = \int_a^b f(x)dx, \quad \mathcal{P}_2 = \int_a^b g(x)dx,$$

## $f$ i $g$ pozitivne funkcije

Ako su  $f$  i  $g$  pozitivne funkcije, imamo




$$\mathcal{P}_1 = \int_a^b f(x)dx, \quad \mathcal{P}_2 = \int_a^b g(x)dx,$$

pa je

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_1 - \mathcal{P}_2 = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx = \int_a^b (f(x) - g(x))dx.$$

*f* pozitivna, *g* negativna


Ako je *f* pozitivna, a *g* negativna funkcija, imamo



$$\mathcal{P}_1 = \int_a^b f(x)dx, \quad \mathcal{P}_2 = - \int_a^b g(x)dx,$$

$f$  pozitivna,  $g$  negativna

Ako je  $f$  pozitivna, a  $g$  negativna funkcija, imamo



$$\mathcal{P}_1 = \int_a^b f(x)dx, \quad \mathcal{P}_2 = - \int_a^b g(x)dx,$$

pa je


$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_1 + \mathcal{P}_2 = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx = \int_a^b (f(x) - g(x))dx.$$

# Formula za površinu

Formulu

$$\mathcal{P} = \int_a^b (f(x) - g(x))dx$$

možemo korisiti i u općem slučaju.



## Primjer 1


Izračunajte površinu podskupa ravnine omeđenog krivuljama

$$y = x + 4 \quad \text{i} \quad y = x^2 - 2x.$$

## Primjer 1

Izračunajte površinu podskupa ravnine omeđenog krivuljama


$$y = x + 4 \quad \text{i} \quad y = x^2 - 2x.$$



## Primjer 1

Izračunajte površinu podskupa ravnine omeđenog krivuljama

$$y = x + 4 \quad \text{i} \quad y = x^2 - 2x.$$



Dobijemo

$$\mathcal{P} = \int_{-1}^4 (x + 4 - (x^2 - 2x)) dx = \dots = \frac{125}{6}.$$

## Primjer 2


Izračunajte površinu podskupa ravnine omeđenog krivuljama

$$y^2 = x + 1 \quad \text{i} \quad y = x - 1.$$

## Primjer 2

Izračunajte površinu podskupa ravnine omeđenog krivuljama


$$y^2 = x + 1 \quad \text{i} \quad y = x - 1.$$



## Primjer 2

Izračunajte površinu podskupa ravnine omeđenog krivuljama

$$y^2 = x + 1 \quad \text{i} \quad y = x - 1.$$




$$\begin{aligned}\mathcal{P} &= \int_{-1}^0 (\sqrt{x+1} - (-\sqrt{x+1})) dx + \int_0^3 (\sqrt{x+1} - (x-1)) dx \\ &= \dots = \frac{9}{2}.\end{aligned}$$

## Druga formula za površinu

Računanje površine podskupa ravnine zadanog uvjetima


$$c \leq y \leq d, \quad g(y) \leq x \leq f(y)$$



## Druga formula za površinu

Računanje površine podskupa ravnine zadanih uvjetima

$$c \leq y \leq d, \quad g(y) \leq x \leq f(y)$$



$$\mathcal{P} = \int_c^d (f(y) - g(y)) dy$$

## Primjer 2 (drugi način)

Izračunajte površinu podskupa ravnine omeđenog krivuljama

$$y^2 = x + 1 \quad \text{i} \quad y = x - 1.$$

## Primjer 2 (drugi način)

Izračunajte površinu podskupa ravnine omeđenog krivuljama

$$y^2 = x + 1 \quad \text{i} \quad y = x - 1.$$

$$x = y^2 - 1, \quad x = y + 1$$

$$f(y) = y^2 - 1, \quad g(y) = y + 1$$


Integriranjem po  $y$  dobijemo

$$\mathcal{P} = \int_{-1}^2 (y + 1 - (y^2 - 1)) dy = \dots = \frac{9}{2}.$$

# Volumen rotacijskog tijela


Rotacijom ravninskog lika oko neke osi rotacije dobije se rotacijsko tijelo.

Npr. rotacijom pravokutnika oko x-osi dobijemo valjak.




## Formula za volumen rotacijskog tijela

Dio rotacijskog tijela od  $x$  do  $x + \Delta x$  je pseudovaljak, tj. približno je valjak polumjera  $f(x)$  i visine  $\Delta x$ .



## Formula za volumen rotacijskog tijela

Dio rotacijskog tijela od  $x$  do  $x + \Delta x$  je pseudovaljak, tj. približno je valjak polumjera  $f(x)$  i visine  $\Delta x$ .



Vrijedi


$$\Delta V \approx f^2(x)\pi\Delta x.$$

Stoga je

$$dV = f^2(x)\pi dx \quad \Rightarrow \quad V' = f^2(x)\pi.$$

## Formula za volumen rotacijskog tijela

Dio rotacijskog tijela od  $x$  do  $x + \Delta x$  je pseudovaljak, tj. približno je valjak polumjera  $f(x)$  i visine  $\Delta x$ .



Vrijedi

$$\Delta V \approx f^2(x)\pi\Delta x.$$

Stoga je

$$dV = f^2(x)\pi dx \quad \Rightarrow \quad V' = f^2(x)\pi.$$

Onda za  $V$  dobijemo

$$V = \pi \int_a^b f^2(x)dx.$$


## Primjer 4 (kugla)

Prikažite kuglu kao rotacijsko tijelo i izračunajte njen volumen korištenjem formule za volumen rotacijskog tijela.

## Primjer 4 (kugla)

Prikažite kuglu kao rotacijsko tijelo i izračunajte njen volumen korištenjem formule za volumen rotacijskog tijela.

$$x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow y = \sqrt{r^2 - x^2} \Rightarrow f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$$




$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2}^2 dx = \pi \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx \\ &= \pi \left( r^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-r}^r = \pi \left( r^3 - \frac{r^3}{3} - \left( -r^3 + \frac{r^3}{3} \right) \right) = \frac{4}{3} r^3 \pi \end{aligned}$$

## Primjer 5 (stožac)

Prikažite stožac kao rotacijsko tijelo i izračunajte mu volumen korištenjem formule za volumen rotacijskog tijela.

## Primjer 5 (stožac)

Prikažite stožac kao rotacijsko tijelo i izračunajte mu volumen korištenjem formule za volumen rotacijskog tijela.



pravac kroz točke  $(0, 0)$  i  $(h, r)$ :  $y = \frac{r}{h}x$

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^h \left(\frac{r}{h}x\right)^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx \\ &= \pi \frac{r^2}{h^2} \frac{x^3}{3} \Big|_0^h = \pi \frac{r^2}{h^2} \left(\frac{h^3}{3} - 0\right) = \pi \frac{r^2 h}{3} \end{aligned}$$

## Četiri formule za volumen rotacijskog tijela

- $V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx$

- $V_x = 2\pi \int_c^d g(y) y dy$

- $V_y = \pi \int_c^d g^2(y) dy$

- $V_y = 2\pi \int_a^b f(x) x dx$

## Zadatci

1. Izračunajte površinu područja omeđenog grafom funkcije  $f(x) = x^3$  i pravcima  $x = 2$  i  $y = 27$ .
2. Izračunajte volumen tijela nastalog rotacijom oko  $x$ -osi dijela ravnine omeđenog krivuljom  $y = \sqrt{x - 2}$  i pravcima  $x = 2$  i  $x = 5$ .
3. Izračunajte volumen valjka nastalog rotacijom oko  $y$ -osi pravokutnika s vrhovima  $(0, 0)$ ,  $(0, 5)$ ,  $(2, 5)$  i  $(2, 0)$ .