

# Približno rješavanje jednačba (skica)

## 1. Uvod

Većina se inženjerskih problema svodi na rješavanje jednačba: s jednom ili više nepoznanica, sustava jednačba, matricnih jednačba, diferencijalnih jednačba, integralnih jednačba itd. U pravilu, takve se jednačbe ne mogu egzaktno riješiti. Zato se postavlja problem približnog rješavanja jednačba. Ovdje ćemo skicirati osnovne metode približnog rješavanja jednačba s jednom nepoznaticom.

Jednačba s jednom nepoznaticom je jednačba oblika:

$$f(x)=0,$$

gdje je  $f$  funkcija jedne varijable. Tu se ograničavamo na slučaj kad je  $f$  realna funkcija realne varijable definirana na nekom intervalu realnih brojeva, koja je **neprekinuta** na tom intervalu (tj. graf joj je neprekinuta crta), štoviše, u pravilu mislimo na **elementarne funkcije**  $f$  (tj. na funkcije koje se mogu zadati s konačno mnogo operacija na kalkulatoru), posebice te funkcije imaju derivacije bilo kojeg reda.

**Rješenje jednačbe** je bilo koji realni broj  $x^*$  takav da je  $f(x^*)=0$ .


Može se dogoditi da jednačba nema rješenja, da ima konačno mnogo rješenja, ili da ima beskonačno mnogo rješenja.

**Primjer 1.** (i) Jednačba  $x^2+1=0$  nema (realnih) rješenja.


(ii) Jednačba  $x^2-1=0$  ima dva rješenja:  $x_1 = -1$  i  $x_2 = 1$ .

(iii) Jednačba  $\sin x = 0$  ima beskonačno mnogo rješenja: realne brojeve  $k\pi$ , gdje  $k$  prolazi skupom cijelih brojeva.


**Grafička interpretacija rješenja.** Realna rješenja jednačbe  $f(x)=0$  jesu upravo oni realni brojevi u kojima graf funkcije  $f$  siječe  $x$ -os (sl.1).




**Varijanta:** Realna rješenja jednačbe  $f(x)=g(x)$  je skup prvih koordinata točaka u kojima se sijeku grafovi funkcija  $f$  i  $g$  (sl.2.).



**Interval izoliranosti rješenja.** To je svaki interval  $[a,b]$  unutar kojega ima točno jedno rješenje jednadžbe (sl.3.).



**Primjer 2.** Interval  $[-2,-1]$  je interval izoliranosti rješenja  $-\sqrt{2}$  jednadžbe  $x^2-2=0$ , a interval  $[1,2]$  je interval izoliranosti rješenja  $\sqrt{2}$  te iste jednadžbe (sl.4.). Naravno da ima i uži interval izoliranosti od tih. Na primjer,  $[1.41, 1.42]$  također je interval izoliranosti rješenja  $\sqrt{2}$  jer je  $1.41 < \sqrt{2} < 1.42$ .



**Približno rješenje jednadžbe  $f(x)=0$ .** To je svaki broj  $\alpha$  za koji vrijedi  $f(\alpha) \approx 0$ .

Na primjer, 1.4 je približno rješenje jednadžbe  $x^2-2=0$ . Naime,


$$1.4^2-2 = 1.96-2 = -0.04 \approx 0.$$

Kažemo da je 1.4 **aproksimacija** rješenja  $\sqrt{2}$  te jednadžbe jer je  $\sqrt{2} \approx 1.41$ .

Takodjer, 1.41 je približno rješenje te jednadžbe, jer je

$$1.41^2-2 = 1.9881-2 = -0.0119 \approx 0.$$

Vidimo da je 1.41 **bolja aproksimacija** te jednadžbe od aproksimacije 1.4 ; to se očituje time što je 1.41 bliže broju  $\sqrt{2}$  nego što je 1.4 (sl.5).



**Pogrješka aproksimacije.** To je udaljenost  $\varepsilon$  stvarnog rješenja  $x^*$  i približnog rješenja (aproksimacije)  $\alpha$ , dakle:

$$\varepsilon := |x^* - \alpha|.$$

U pravilu ne znamo točno pogrešku aproksimacije, jer bismo onda znali i rješenje. Zato je potrebno znati neku ocjenu za pogrešku. Ta se ocjena zove **ocjena grješke**. Na primjer, za aproksimaciju 1.4 od  $\sqrt{2}$ , vrijedi da je  $\varepsilon < 0.1$  (to je ocjena grješke), jer je

$$1.4 < \sqrt{2} < 1.5.$$

**Metoda približnog rješavanja jednadžba.** To je svaka metoda kojom se startajući od nulte aproksimacije  $x_0$ , unutar intervala izoliranosti rješenja  $x^*$ , redom dobivaju sve bolje aproksimacije  $x_1, x_2, \dots$  koje se približavaju (konvergiraju) pravom rješenju  $x^*$ .

## 2. Metoda tangente (Newtonova metoda).


Ta se metoda geometrijski zasniva na povlačenju tangente na graf funkcije  $f$  koja sudjeluje u jednadžbi  $f(x)=0$  (sl.6).

Analitički, nakon biranja nulte aproksimacije ( $x_0=a$  ili  $x_0=b$ , za interval izoliranosti  $[a,b]$ ), dobijemo:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \text{ i, općenito,}$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$



**Primjer 3.** Metodom tangente približno riješimo jednadžbu  $e^x = x + 2$ .

**Važna napomena.** Od 7. sljedećih koraka, za kolegij su relevantni samo 1,2, 6 i 7. Ostali se mogu zanemariti.

**1. korak.** Izolacija rješenja.

Provodimo je **grafičkom** i **analitičkom metodom**.


**Grafička metoda:** nacrtamo u istom koordinatnom sustavu krivulje s jednadžbama:

$$y=e^x \text{ i } y = x+2.$$

Vidimo da se te krivulje sijeku u dvjema točkama, zato jednadžba ima dva rješenja (sl.7.). Prvo je rješenje između  $-2$  i  $-1$ , a drugo između  $1$  i  $2$ .

Analitička metoda

x	$e^x - x - 2$	
0	-1	
1	-0.28	
2	3.39	
-----		
-1	-0.6	
-2	0.13	



S objema metodama dolazimo do istog zaključka o broju rješenja.

**2. korak.** Računanje 1. i 2. derivacije funkcije  $f(x) := e^x - x - 2$ .  
 $f'(x) = e^x - 1$  ;  $f''(x) = e^x$ .

3. korak. Provjeravanje monotonosti funkcija  $f'$ ,  $f''$  na dobivenim intervalima, potom njihovim neponištanjem na tim intervalima.

Polazimo od druge derivacije (jer pomoću nje lakše možemo ocijeniti prvu; iako u ovom primjeru to nije potrebno jer sve teče glatko).

Očito je  $f''$  rastuća i pozitivna svugdje, posebice na tim intervalima.

$f'$  je također rastuća (što vidimo izravno, ali i iz toga što je  $f''$  svugdje pozitivna);

Dalje:  $f'(x) > 0$ , za sve  $x$  iz  $[1, 2]$  (što je zbog rasta dovoljno provjeriti u  $x=1$ )

$f'(x) < 0$ , za sve  $x$  iz  $[-2, -1]$  (što je zbog rasta dovoljno provjeriti u  $x=-1$ ).

4. korak. Određivanje minimuma apsolutnih vrijednosti prve derivacije te maksimuma apsolutnih vrijednosti 2. derivacije na tim intervalima. Točnije:

$m < \min|f'(x)|$ , za  $x$  u pojedinom intervalu

$M > \max|f''(x)|$ , za  $x$  u pojedinom intervalu.

(ove smo znakove izabrali jer će nam se  $m$  nalaziti u nazivniku određene formule, a  $M$  u brojniku te formule).

Moramo posebno raditi na svakom od intervala. Iz koraka 3. znademo da su  $f'$  i  $f''$  monotone na tim intervalima i da na njima ne mijenjaju predznak. To nam omogućuje da  $m, M$

izaberemo računajući samo vrijednosti funkcija u rubovima (inače tako ne bismo smjeli).

Interval  $[1, 2]$ . Skicirajmo grafove od  $f'$  i  $f''$ .

Zaključujemo:

$\min|f'(x)| = e - 1$ , pa možemo uzeti  $m = 1.7$

(približni smo rezultat dobili

zaokruživanjem na niže, odnosno odbacivanjem znamenaka).

$\max|f''(x)| = e^2$ , pa možemo uzeti  $M = 7.4$

(zaokruživanje na više).

Interval  $[-2, -1]$ . Opet skicirajmo grafove.

Zaključujemo:

$\min|f'(x)|=1-e^{-1}$ , pa možemo uzeti  $m=0.6$

$\max|f''(x)|=e^{-1}$ , pa možemo uzeti  $M=0.4$ .

5. korak. Određivanje uvjeta za zadanu točnost.

Iz formule  $|x^*-x_{n+1}| < \frac{f^2(x_n)}{2} \cdot \frac{M}{m^3}$

i zahtjeva u zadatku:  $|x^*-x_{n+1}| < 0.001$ ,

vidimo da je dovoljno uzeti da bude:  $\frac{f^2(x_n)}{2} \cdot \frac{M}{m^3} < 0.001$ , odnosno

$$f^2(x_n) < \frac{2m^3}{M} \cdot 0.001$$

Taj uvjet treba posebno računati za svaki od intervala.

Interval [1,2].

Dobijemo:

$$f^2(x_n) < 0.003 \text{ (uzimamo manji broj, odnosno, zaokružujemo na niže).}$$

Interval [-2,-1]

Dobijemo:

$$f^2(x_n) < 0.0037$$

Smisao ove ocjene je sljedeći: kad dođemo da takvog  $n$  za koji će to vrijediti, onda stajemo, a za dobru približnu vrijednost uzimamo  $x_{n+1}$ .

**6. korak.** Biranje nulte aproksimacije  $x_0$ .

Biramo je tako da bude rubna točka intervala uz uvjet  $f(x_0)f'(x_0) > 0$ .

Treba posebno birati za svaki od intervala.

Interval [1,2].

Dobijemo

$$x_0=2$$

Interval [-2,-1]

Dobijemo

$$x_0=-2$$

**7. korak.** Računanje aproksimacija pomoću formule  $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ ,

tj. pomoću formule:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{e^{x_n} - x_n - 2}{e^{x_n} - 1}$$

I to se provodi posebno za svaki interval.

Interval [1,2].

$$x_1 = 2 - \frac{e^2 - 2 - 2}{e^2 - 1} = 1.46955$$

$$x_2 = 1.46955 - \frac{e^{1.46955} - 1.46955 - 2}{e^{1.46955} - 1} = 1.2073$$

$$x_3 = 1.1488$$

$$x_4 = 1.1462$$

Interval [-2,-1].

$$x_1 = -2 - \frac{e^{-2} - (-2) - 2}{e^{-2} - 1} = -1.84348$$

$$x_2 = -1.8414$$

(Rješenje zadovoljava tražene uvjete.)

(Rješenje zadovoljava tražene uvjete, jer je  $(e^{1.1488} - 1.1488 - 2)^2 < 0.000032 < 0.003$ )

### 3. Metoda iteracije

Ta se metoda zasniva na zgodnu zapisivanju originalne jednadžbe  $f(x)=0$ , u obliku  $\varphi(x)=x$  i iteriranju:


$$x_1 = \varphi(x_0)$$

$$x_2 = \varphi(x_1)$$

i općenito

$$x_{n+1} = \varphi(x_n)$$

Geometrijski je metoda predočena slikom 8.



Sad ćemo jednadžbu iz Primjera 3 riješiti metodom iteracije.

**Primjer 3.** Metodom iteracije približno riješimo jednadžbu  $e^x = x + 2$ .

Važna napomena. Od 6 koraka za kolegij su relevantna samo 1,2 i 6; ostali se mogu zanemariti. Umjesto 3. i 4. koraka, ako uočimo da aproksimacija bježi izvan izabranog intervala izoliranosti, interval treba suziti, ili, ako to ne pomaže, prijeći na inverznu funkciju, kako ćemo i pokazati u ovom primjeru.

**1. korak.** Izolacija rješenja.

Ostaje isti kao kod metode tangente.

**2. korak.** Zapisivanje jednadžbe u obliku  $\varphi(x) = x$ .

To se posebno radi za svaki od intervala jer se može dogoditi da za svaki bude posebna funkcija  $\varphi$ . Biranje te funkcije povezano je sa zahtjevom  $|\varphi'(x)| < 1$  na tom intervalu.

Interval  $[1,2]$

Pokušaj da se jednadžba napiše u obliku  $e^x - 2 = x$ , tj. biranje  $\varphi(x) := e^x - 2$ , propada jer bi tada bilo  $\varphi'(x) := e^x$ , što je  $> 1$  za sve  $x > 0$ , posebice za  $x$  između 1 i 2.

Interval  $[-2,-1]$

Tu je dobro  $e^x - 2 = x$ , tj.  $\varphi(x) := e^x - 2$  (jer je  $e^x < 1$  za  $x$  iz  $[-2,-1]$ ).

Zato treba pokušati s inverznom funkcijom,  
tj. sa zapisom:  $e^x = x+2$ , iz kojega dobijemo:  
 $x = \ln(x+2)$ , tj.  $\varphi(x) := \ln(x+2)$ .

To će biti dobro jer je sada  
 $\varphi'(x) := 1/(x+2)$  što je  $< 1$  na intervalu  $[1,2]$ .

**3. korak.** Provjeravanje da  $\varphi$  preslikava interval u interval.

Provjeravanje se vrši posebno za svaki od intervala. Da bi se provelo dovoljno je provjeriti da je  $\varphi$  monotona na intervalu; tada će biti dovoljno provjeriti uvjet u rubovima (ako bude potrebno, početni interval možemo i smanjiti).

Interval  $[1,2]$

Kako je  $\ln$  rastuća funkcija i  $\varphi(x) = \ln(x+2)$  je rastuća funkcija. Provjerimo je li  $1 < \varphi(1) < 2$  i  $1 < \varphi(2) < 2$ .

Kako je  $\varphi(1) = \ln 3 = 1.0986\dots$  i

$$\varphi(2) = \ln 4 = 1.386\dots$$

to je ispunjeno.

Interval  $[-2,-1]$

Kako je  $e^x$  rastuća funkcija i  $\varphi(x) = e^x - 2$  je rastuća, posebice i na tom intervalu, gledamo:

$$\varphi(-2) = -1.8647; \quad \varphi(-1) = -1.6321.$$

Uvjet je zadovoljen.

**4. Određivanje broja  $\mu$** , tako da bude  $|\varphi'(x)| \leq \mu < 1$  za sve  $x$  iz intervala.

Taj je korak povezan s drugim i posebno se radi za svaki od intervala. Da bi se mogao provesti dovoljno je pokazati da je  $\varphi'$  monotona na svakom od intervala (pa se provjera vrši samo u rubnim točkama). Ako bude bilo potrebno, možemo smanjiti početni interval (naravno, pazeci da rješenje ostane u njemu i da uvjet iz prethodnog koraka ne bude narušen).

Interval  $[1,2]$ .

Kako je  $1/(x+2)$  padajuća funkcija i pozitivna na tom intervalu, dovoljno je gledati  $\varphi'(1)$  tj.  $1/3$  pa možemo uzeti  $\mu = 0.34$

Interval  $[-2,-1]$

Kako je sada  $\varphi'(x) = e^x$ , što je rastuća i pozitivna funkcija, dovoljno je gledati  $\varphi'(-1)$ , tj.  $1/e$  pa možemo uzeti  $\mu = 0.37$ .

**5. Određivanje uvjeta točnosti.**

To radimo koristeći se ocjenom  $|x_n^* - x_n| \leq \frac{\mu}{1-\mu} |x_n - x_{n-1}|$

odakle se dobije da je dovoljno da bude:

$$|x_n - x_{n-1}| \leq \frac{1-\mu}{\mu} \varepsilon.$$

To se posebno radi za svaki od intervala.

Interval  $[1,2]$

Dobijemo

$|x_n - x_{n-1}| < 0.0019$  (biramo manji broj od stvarno izračunatog).

Interval  $[-2,-1]$

Dobijemo

$|x_n - x_{n-1}| < 0.0017$

Smisao je ovih ocjena u tome da prestajemo za onaj  $n$  kad one budu ispunjene, a za dobru aproksimaciju uzimamo  $x_{n+1}$ .

**6. korak.** Računanje aproksimacija prema formuli  $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ .

I ovo se provodi posebno za svaki od intervala. Nultu aproksimaciju biramo po volji u početnom intervalu (obično neku od rubnih točaka).

Interval [1,2].

Formula je  $x_{n+1} = \ln(x_n + 2)$

$x_0 = 1$  (mogli smo izabrati bilo koji broj intervala [1,2])

$$x_1 = \ln(1+2) = \ln 3 = 1.0986$$

$$x_2 = \ln 3.0986 = 1.13095$$

$$x_3 = 1.141338$$

$$1.14465$$

$$1.14570$$

$$1.14604$$

Kako je razlika 5. i 4. aproks.

manja od 0.0019,

dobro je 6. aproksimacija

za zadanu točnost.

Interval [-2,-1]

Formula je  $x_{n+1} = e^{x_n} - 2$

$$x_0 = -1.$$

$$x_1 = e^{-1} - 2 = -1.63212$$

$$-1.80449$$

$$-1.83544$$

$$-1.84046$$

$$-1.84126$$

$$-1.84138$$

**Komentar.** Objema smo metodama približno dobili ista rješenja. Metodom tangente teže je računati, ali treba manje koraka (u ovim primjerima); dok je metodom iteracije puno lakše računati.